

Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Reifemessungen 2007

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Gesamt- säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l
		06.08.. 2007	Diff. zur Vorwoche	07.08. 2006	08.08. 2005			
Freiburg								
1	Müller-Thurgau (Schlierbergsteige)	55	-	-	-	12,8	3,0	7,6
2	Müller-Thurgau (Wonnhalde)	54	+ 10	-	-	15,6	2,8	8,0
3	Weißer Burgunder (Wonnhalde)	54	-	-	-	23,1	2,7	8,4
4	Grauer Burgunder (Wonnhalde)	55	+ 12	-	-	20,9	2,7	7,9
5	Chardonnay (Schloßberg)	-	-	-	-	-	-	-
6	Spätburgunder (Schlierbergsteige)	44	-	-	-	26,6	2,8	9,2
7	Spätburgunder (Wonnhalde)	50	-	-	-	27,2	2,7	8,9
8	Gutedel (Wonnhalde)	43	-	-	-	18,1	2,8	7,3
9	Riesling (Schloßberg, oben)	39	-	-	-	25,0	2,7	10,3
10	Auxerrois (Eichhalde)	52	+ 10	-	-	15,9	2,8	8,2
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
11	Solaris (Ebringen)	101	+ 18	-	-	8,3	3,1	7,2
12	Johanniter (Ebringen)	60	+ 16	-	-	14,9	2,8	8,0
13	Regent (Ebringen)	68	+ 4	-	-	10,3	3,0	5,7
14	Cabernet Cortis (Ebringen)	83	+ 12	-	-	9,9	2,9	7,2
15	Prior (Ebringen)	61	-	-	-	17,2	2,8	8,0
Blankenhornsberg								
16	Müller-Thurgau (Balsch. Hang unt.)	58	+ 5	-	-	11,5	3,0	6,5
17	Weißer Burgunder (Osthang)	48	+ 19	-	-	23,8	2,7	8,8
18	Weißer Burgunder (Adolfsberg, alt)	49	+ 13	-	-	22,7	2,8	8,4
19	Grauer Burgunder (Doktorboden)	51	+ 12	-	-	22,6	2,8	8,2
20	Grauer Burgunder (unterer Boden)	58	+ 21	-	-	18,1	2,9	7,8
21	Spätburgunder (Balschental Hang)	59	+ 16	-	-	18,7	2,9	7,8
22	Spätburgunder (oberer Boden)	55	+ 19	-	-	19,7	2,8	7,7
23	Riesling (Weißenberg)	45	+ 17	-	-	22,5	2,8	9,8
24	Riesling (Doktorboden)	41	+ 14	-	-	25,1	2,7	10,6
25	Muskateller (große Terrasse)	62	+ 12	-	-	13,3	3,0	6,7
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
26	Solaris (Balschental)	86	+ 10	-	-	8,7	3,0	6,8
27	Cabernet Carbon (unt. mittl. Weg)	49	+ 17	-	-	21,5	2,6	11,4